

Neue Bracon-Arten aus der Ukraine.

Von N. Greese, Kiew.

Bracon (Striobracon Fahr.) sylvanus m.

Kopf quer, hinten den Augen stark verschmälert und abgerundet, Fühler 32—33gliedrig, so lang wie der Körper. Notaulen ausgebildet; Mediansegment runzelig mit Kiel. Hinterleib länglichoval, zweite Sutura bisinuiert, zweites Tergit ziemlich grob runzelig, die übrigen chagriniert. Bohrer kürzer als der Hinterleib (von $\frac{3}{4}$ Hinterleibslänge).

Kopf und Taster rotgelb; Stemmaticum, Scheitel und Fühler schwarz, die letzteren unten bräunlich. Thorax schwarz, Pleuren und Parapsidenfurchen mehr oder weniger ausgedehnt rotgelb (bei einem Exemplar das ganze Mesonotum sowie auch das Schildchen rotgelb); Beine gelb (in einem Falle sind die Hinterhüften außen schwarz gefleckt); Flügel hyalin, Stigma bräunlich. Hinterleib rotgelb, Tergite 1.—5. mit schwarzen Flecken. Länge 3—3.5 mm. Bohrer 1.5 mm.

5 ♀♀ Darniza (Bezirk Kiew), Forstliche Versuchsstation. 23. VI. 26, 17. VIII. 26, 13. VI. 27, 14. VIII. 27.

Bracon (Striobracon Fahr.) rhynchiti m.

Kopf quer, hinter den Augen verschmälert, Fühler 29gliedrig, beim ♀ so lang wie der Körper, beim ♂ etwas länger. Notaulen deutlich, Mediansegment glatt und glänzend; Radialzelle erreicht nicht die Flügelspitze. Hinterleib runzelig, zweites Tergit etwas länger als das dritte; zweite Sutura bisinuiert; Bohrer länger als der Hinterleib.

Kopf schwarz, Augenränder braunrot, Palpen gelbbraun. Thorax schwarz; Beine gelb mit schwarzen Hüften; Flügel bräunlich getrübt, Stigma braun. Hinterleib schmutziggelb; erstes Tergit schwarz, die übrigen in der Mitte schwarzbraun. Länge ♀ 2.8 mm. Bohrer 2 mm. ♂ 2 mm.

♂♂ und ♀♀ Mlejowo (Bezirk Kiew), Versuchsstation,
5. VI. 26. *B. rhynchiti* wurde aus *Rhynchites bacchus* gezogen.

Bracon (Lucobracon Fahr.) scythus m.

Kopf quer, hinter den Augen nicht verschmälert, Fühler 30gliedrig, etwas kürzer als der Körper. Thorax glänzend, Notaulen nicht ausgebildet; Mediansegment glatt, mit deutlicher Mittelfurche; Radialzelle erreicht fast die Flügelspitze. Hinterleib breitoval, etwas kürzer als Kopf und Thorax, zweite Sutur bisinuiert, zweites Tergit runzelig; Bohrer von Körperlänge.

Kopf, Taster, Fühler, Thorax und Beine schwarz; Kniee aller Beine gelblich. Hinterleib rotgelb, Tergite 1.—5. schwarz in der Mitte; Flügel bräunlich mit helleren Rändern, Stigma braun. Länge 4 mm, Bohrer 4 mm.

1 ♀ Mirgorod, 5. VII. 27.

Bracon (Glabrobracon Fahr.) chrysostigma m.

Kopf quer, hinter den Augen verschmälert und abgerundet; Fühler 32gliedrig, von Körperlänge. Thorax glatt und glänzend, Notaulen ausgebildet; Mediansegment poliert, mit ganz seichter Längsfurche. Hinterleib länglich oval, glänzend; zweite Sutur in der Mitte leicht winkelig ausgeschnitten; Hypopygium ragt ein wenig über die Hinterleibsspitze hinaus; Bohrer länger als der Hinterleib.

Kopf, Mandibeln und Taster rotgelb; Stirn, Stemmaticum, Hinterhaupt und Fühler schwarz. Thorax schwarz, Pro- und Mesonotum, Tegulae und Flecke unter der Flügelbasis rotgelb. Beine rotgelb; Mittel- und Hinterhüften, Hinterschienen am Ende und Hintertarsen schwärzlich. Flügel getrübt, mit einer dunkleren Wolke in der Mitte, unter dem ockergelben Stigma ein heller Streifen. Hinterleib schwarz; die zwei ersten Tergite rotgelb. Länge 4 mm. Bohrer 3.5 mm.

var. *nigrofemoratus m.* Basalhälfte der Hinterschenkel schwarz; Mitte des zweiten Tergites gebräunt.

5 ♀♀ Darniza, Forstliche Versuchsstation, 5. VI. 26, 8. VII. 26, 9. VII. 26, 18. VII. 26, 27. VI. 27.